

シバオサゾウムシ防除に使用される芝適用・登録殺虫剤

2026.2.10(26-1)
ゴルフ場防除技術研究会

No.	商品名	一般名	AI %	メーカー(登録)	毒性		使用量(m ² 当り)			流通	適用登録*シバオサ		使用時期
					LD ₅₀	TLm	希釈倍数(倍)	水量(L)	薬量(g/ml)		幼虫	成虫	
1	イザナミフロアブル	フルキサメタミド	10%	日産緑化	普		1,000・2,000	0.2・0.5	0.2・0.25	日産化学	○	○	発生初期
2	エンバーMC	ベルメトリン(マイクロカプセル)	10%	住友化学	普	A	1,000~2,000	0.3	0.15~0.3	レインボー薬品		○	発生初期
3	ガゼット粒剤	カルボスルファン	3%	日産化学、FMC、石原バイオ	劇	BS	—	—	5~10	石原バイオ、日産化学		○	発生初期
4	カルホス乳剤(販売終了)	イソキサチオン	50%	保土谷UPL	劇	B	1,000	1~2	1~2	ニッソーグリーン	○	○	発生初期
5	グリーンカルホス乳剤(販売終了)	イソキサチオン	50%	保土谷化学	劇	B	1,000	1~2	1~2	理研グリーン	○	○	発生初期
6	スミチオン乳剤	MEP	50%	住友化学、各社	普	B	1,000	3	3	各社	○	○	幼虫発生期
7	ダイアジノン乳剤40	ダイアジノン	40%	日本化薬、他各社	劇	BS	1,000	0.3~0.5	0.3~0.5	各社	○	○	発生初期
8	ダイアジノンSLゾル	ダイアジノン	25%	日本化薬	普	A	1,000(成虫)、 250(幼虫)	0.3、0.7~1.0	0.3*、2.8~4	東洋グリーン、トモグリーン、丸善薬品、テクノグリーン、理研グリーン	○	○	発生初期
9	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン	5%	日本化薬、他各社	普	BS	—	—	6~9	北興産業、ニチノ一緑化他		○	発生初期
10	タフスティンガーフロアブル	イミダクロプリド・フルベンジアミド	25%・15%	日本農薬	劇	A	2,000	0.1	0.1	ニチノ一緑化	○	○	発生初期
11	タフバリアフロアブル	イミダクロプリド	20%	エンバイロサイエンス	劇		500~2,500	0.1~0.5	0.2	エンバイロサイエンス	○	○	発生初期
12	ダブルトリガー液剤	シクラニプロール	4.5	石原バイオ	普		500~1,500	0.1~0.3	0.2	石原バイオ、理研グリーン	○		発生前~発生初期
13	テトリーノフロアブル	テトラニプロール	4%	エンバイロサイエンス	普		800~2,000	0.2~0.5	0.25	エンバイロサイエンス	○	○	発生初期
14	テラフロアブル	プロフラニド	20%	三井化学クロップ&ライフソリューション、クミアイ化学	普		2,000・8,000・ 20,000	0.05・0.2・0.5	0.025	理研グリーン、エムシー緑化	○		発生初期
15	ナイスイーグルSC	クロルフルアズロン	10%	石原バイオ	普		1,333~4,000、 *10.7~42.7	0.1~0.3、*0.8 ~3.2ml	0.75	石原バイオ	○	○	発生初期
16	ビートルコップ顆粒水和剤	チアメトキサム	25%	シンジェンタ	普		400~4,000	0.1~1	0.125~0.25	シンジェンタ特約店	○	○	発生初期
17	フルスウィング	クロチアニジン	50%	レインボー薬品	普	A	5,000	0.5	0.1	レインボー薬品	○	○	発生初期
18	リラークDF	チオジカルブ	78%	エンバイロサイエンス	劇		500~2,000	0.25~1	0.25~1	エンバイロサイエンス		○	発生初期