

コガネムシ類に使用される芝適用・登録殺虫剤一覧表

2020.2.12(20-1)
ゴルフ場防除技術研究会

No.	商品名	製剤	一般名	AI %	メーカー (登録)	毒性		使用量(m ² 当り)			流通	使用時期	使用方法
						LD ₅₀	TLm	希釈倍数(倍)	水量(L)	薬量(g/ml)			
1	アセルプリン	FL	クロラントラニプロール	18.4%	シンジェンタ特約店	普		1,667~10,000	0.2~1	0.05~0.1	シンジェンタ	発生前~発生初期	散布
2	イザナミフロアブル	FL	フルキサメタミド	10%	日産緑化	普		2,000	0.5	0.25	日産化学	発生初期	散布
3	エスベランサ	WP	シアントラニプロール	18.7%	クミアイ化学	普		4,000	0.2	0.05	理研グリーン	発生前~発生初期	散布
4	エンバーMC	MC	ペルメトリン(マイクロカプセル)	10%	住友化学	普	A	500~1,000	0.5~1	1	レインボー薬品	発生初期	散布
5	ガゼット粒剤	G	カルボスルファン	3%	日産化学、FMC、石原バイオ	劇	BS	—	—	5~10	石原バイオ、日産化学	発生初期	散布
6	カルホス乳剤	EC	イソキサチオン	50%	保土谷UPL	劇	B	1,000	1~2	1~2	ニッソーグリーン	発生初期	散布
7	グリーンカルホス乳剤	EC	イソキサチオン	50%	保土谷化学	劇	B	1,000	1~2	1~2	理研グリーン	発生初期	散布
8	シバラックMC	MC	BPMC・MEPマイクロカプセル	10%・15%	サンケイ化学	普		500	3	6	ニチノ一緑化他、特約店	発生初期	散布
9	ショットイン乳剤	EC	テフルベンズロン	10%	理研グリーン	普	A	1,500	0.5~1	0.3~0.7	理研グリーン	発生初期	土壌注入
10	ショットガン	EW	ダイアジノン	40%	日本化薬	劇	A	1,000	3	3	各社	発生初期	散布
11	シラトップEW	EC	シラフルオフエン	38%	バイエル	普		2,000	3	1.5	バイエル	発生初期	散布
12	スミチオン乳剤	EC	MEP	50%	住友化学、各社	普	B	1,000	3	3	各社	発生初期	散布
13	ダイアジノン乳剤40	EC	ダイアジノン	40%	日本化薬、他各社	劇	BS	800	3	3.8	各社	発生初期	散布
14	ダイアジノン粒剤5	G	ダイアジノン	5%	日本化薬、他各社	普	BS	—	—	9	北興産業、ニチノ一緑化他	発生初期	散布
15	ダイアジノンSLゾル	MC	ダイアジノン	25%	日本化薬	普	A	25*250**	0.1~1	2.8~4、4*	東洋グリーン、トモグリーン、丸善薬品、テクノグリーン、理研グリーン	発生初期・コアリク [®] 時 目土前**	土壌注入*(張り芝前) コアリク [®] 時目土前**
16	タフスティンガーフロアブル	FL	イミダクロプリド・フルベンジアミド	25%・15%	日本農業	劇	A	2,000	0.1	0.1	ニチノ一緑化	発生初期	散布
17	タフバリアフロアブル	FL	イミダクロプリド	20%	バイエル	劇		500~2,500	0.1~0.5	0.2	バイエル	成虫産卵期~ 幼虫発生初期	散布
18	ダブルトリガー液剤	FL	シクラニプロール	4.5	石原バイオ	普		250~750	0.1~0.3	0.4	石原バイオ、理研グリーン	発生前~発生初期	散布
19	ナイスイーグルSC	FL	クロルフルアズロン	10%	石原バイオ	普		2,000~4,000	0.5~1	0.25	石原バイオ	発生初期	散布
20	バイオトピア	WP	スタイナーネマ・グラセライ	1.25億頭/1パック	エス・ディー・エス	普	A	—	0.5~2	綿虫25万頭	エス・ディー・エス	発生初期	散布
21	ビートルコップ顆粒水和剤	WP	チアメキサム	25%	シンジェンタ	普		400~4,000	0.1~2	0.25~0.5	シンジェンタ特約店	発生初期	散布
22	フルスウィング	WP	クロチアニジン	50%	レインボー薬品	普	A	1,000、5,000	0.1~1	0.1~0.2	レインボー薬品	発生初期	散布
23	緑化用スミチオン乳剤	EC	MEP	50%	レインボー薬品	普		1,000	3	3	レインボー薬品	発生初期	散布
24	リラークDF	WP	チオジカルブ	78%	バイエル	劇		2,000	3	1.5	バイエル	発生初期	散布

*対象形態は全てコガネムシの幼虫