

芝生適用登録農薬(藻類・苔類)

2025.8.6(25-2)
ゴルフ場防除技術研究会

[登録順]

商品名	オーソサイド水和剤80	キレーダー	オキシンドー水和剤80	ドウグリン水和剤	ダコニールターフ	ベンコシャイン水和剤
分類	殺菌剤	除草剤	殺菌剤	殺菌剤	殺菌剤	殺菌剤
一般名	キャプタン	ACN(キノクラミン)	有機銅	有機銅	TPN	オキスピコナゾールフル酸塩
						マンゼブ
有効成分含有量	80%	25%	80%	80%	53%	2.5% 65%
メーカー	(原体) アリスト	アグロカネショウ	日本農薬		エス・ディー・エス	大塚化学
	(登録) 北興化学、サンケイ化学、アリスト	アグロカネショウ	日本農薬	アグロカネショウ	エス・ディー・エス	クミアイ化学、大塚化学
試験名		KH-193				OKUF-0001水和剤
登録年月日	昭和44年11月20日・昭和46年4月21日・平成16年5月25日	昭和53年2月8日	昭和58年12月16日	平成3年4月22日	平成11年8月20日	平成14年11月12日
登録番号	10529・11508・21292・24955	13870	15664	17832	20210	20954・20955
登録上	作物名	芝、西洋芝(ベントグラス)	日本芝(コウライ)、西洋芝(ベントグラス)	芝、ベントグラス	日本芝、西洋芝(ベントグラス)	日本芝、西洋芝(ベントグラス)
	雑草	苔・藻類	日本芝・藻類・苔類、西洋芝・苔類	苔類	苔・藻類	苔・藻類
	使用時期	芝生育期(雑草発生初期)	藻類・コケ類の発生時(日本芝)、冬期芝生育期(コケ類の発生時)(西洋芝)	発病初期	コケ類発生前～生育期、藻類発生前	春夏期コケ類生育初期、藻類発生前～初期
	葉量	1～2g/m ²	3～4g/m ² (日本芝)、2～4g/m ² (西洋芝)	0.2～0.3g/m ²	2.5g/m ²	1～1.54ml/m ²
	水量	0.5L/m ²	0.2～0.3L/m ²	0.5～2L/m ²	0.1～0.3L/m ²	1L/m ²
	使用方法	散布	散布	散布	散布	散布
急性経口毒性LD50 (mg/kg)	普:ラット5,000以上	普:マウス1,350(原体)	普:マウス7,000～8,000	普:ラット♀2,000、マウス♀5,800	普:ラット5,119(乳剤)	普:ラット>2,000
魚毒性TL ₅₀ (ppm)	C:コイ0.4(48h)	B-s:コイ0.7(原体)	C:コイ0.18(48h)	C:コイ0.18(48h)	C:コイ0.0775	コイ4.71(96h)
水溶解度	0.5ppm以下	20			0.6ppm	
半減期	5日	約5日			10～50日	
スペクトラム	芝:「ラウンバッヂ・赤焼病、西洋芝:炭疽病*・藻類**・コケ類**	藻類、苔類	雪腐病*、かさ枯病**、コケ類***	日本芝:ヘルミントスボリウム・カーブラリア、西洋芝:「ラウンバッヂ・ヘルミントスボリウム・カーブラリア・ティカル・オールバッヂ・雪腐小粒菌核病*・紅色雪腐病*・かさ枯病・褐条病・藻類**・コケ類**	西洋芝:炭疽病*・「ラウンバッヂ・ヘルミントスボリウム・コケ類・藻類、日本芝:ヘルミントスボリウム・藻類(発生前)	西洋芝:「ラウンバッヂ・炭疽病・藻類、日本芝:カーブラリア
樹木等への影響		葉にかかると葉害				
洋芝への影響						
作用機作		葉綠素破壊			SH基阻害	
効果	発現	早い				
	完成	早い				
	残効	10～20日				
	芝安全性	高い		高温時、葉害有り	高い	
流通	ニチノー緑化、理研グリーン、日産化学、他	アグロカネショウ	日産化学、ニチノー緑化	アグロカネショウ	理研グリーン、レインボー薬品	理研グリーン
包装	500g×20、1kg×20	500g×20	1kg×20	1kg×10	1L×12	1kg×10
A価/kg.L	3,645	11,544	6,335	6,812	6,170	3,900
¥/m ²	3.7～7.3	23.1～46.2	1.3～2	17.1	6.2～9.6	11.7

芝生適用登録農薬(藻類・苔類)

2025.8.6(25-2)
ゴルフ場防除技術研究会

[登録順]

商品名	芝用エコパートFL	プロテクメートWDG	メダリオン水和剤	ダコグリーン顆粒水和剤	タスク39DF	ユニゾン水和剤
分類	除草剤	殺菌剤	殺菌剤	殺菌剤	除草剤	殺菌剤
一般名	ピラフルフェンエチル	プロピネブ	フルジオキソニル	TPN	カルフェントラゾンエチル	ペンチオピラド
				チウラム		マンゼブ
有効成分含有量	2%	70%	50%	50% 30%	39%	4.25% 65%
メーカー	(原体) 日本農薬	バイエルクロップサイエンス	シンジェンタ	大内新興化学、エス・ディー・エス	エフエムシー・ケミカルズ	三井化学クロップ&ライフソリューション、UPL
	(登録) ニチノー緑化	エンバイロサイエンス	シンジェンタ	エス・ディー・エス、レインボーユニット、クミアイ化学	理研グリーン	三井化学クロップ&ライフソリューション、理研グリーン
試験名	NHK-061		SYJ-214	SB-3651顆粒水和剤		KUF-2301
登録年月日	平成20年11月19日	平成21年4月8日	平成21年12月2日	平成24年3月21日	平成25年12月4日	平成26年2月12日
登録番号	22300	22362	22532	23060・23061・23062	23395	23428・23429
登録上	作物名	日本芝(コウライ)、西洋芝(ペントグラス)	西洋芝(ペントグラス)	日本芝、西洋芝(ペントグラス)	西洋芝(ペント・ブルー)、日本芝(コウライ)	西洋芝(ペントグラス)、日本芝、日本芝(コウライ・シバ)
	雑草	一年生及び多年生広葉雑草、一年生イネ科雑草、苔類	藻類	藻類	藻類	コケ類
	使用時期	日本芝:芝休眠期(雑草生育初期)、ペントグラス:春夏秋期芝生育期(雑草生育初期)、春夏期芝生育期(苔類生育期)	藻類発生始期(芝生育期)	発病初期	発病初期	芝生育期(コケ生育期)
	葉量	0.1~0.2ml/m ² (一年生広葉)、0.4~0.6ml/m ² (多年生広葉、一年生イネ科)、0.2~0.6ml/m ² (苔類)	2~3g/m ²	0.2~0.4g/m ²	2g/m ²	0.03~0.06g/m ²
	水量	0.1~0.2L/m ²	0.5L/m ²	0.5L/m ²	0.5L/m ²	0.1~0.2L/m ²
	使用方法	雑草茎葉散布	散布	散布	散布	散布
	急性経口毒性LD50(mg/kg)	普:ラット♂♀>5,000	普:ラット♂♀>5,000	普:ラット>5,000	普:ラット300以上(製剤)	普:ラット♀>5,000
魚毒性TLm(ppm)	A:コイ>500(LC50)(96h)	コイ>100(96h)	コイ25(製剤)(96h)	コイ150(96h)	コイ>140(96h)	コイ2.37(96h)
水溶解度	0.05(25°C)		1.8ppm(25°C)	0.81ppm(25°C)	22	
半減期						
スペクトラム	広葉雑草全般、一年生イネ科、苔類	藻類*、赤焼病*、ビシウム病*、炭疽病**	日本芝:カーブラリア**、ペントグラス:炭疽病*、ブルウンバッヂ**、テッド・スボット**、紅色雪腐病***、藻類****、トレクスレラ**	ペント・ブランバッヂ・炭疽病・ダラースホット・トレクスレラ・藻類*・コケ類*・ブルートレクスレラ、日本芝:カーブラリア・藻類*	コケ類	西洋芝:藻類・ブルウンバッヂ・炭疽病・ダラースホット・ビシウム病、日本芝:カーブラリア、コウライ・シバ・藻類
樹木等への影響	ドリフト注意				影響有り	
洋芝への影響	ペントには安全性高い、バミューダには薬害有り				安全性高い	
作用機作	プロトックス阻害				PPO阻害	
効果	発現	1~3日				
	完成	1週間				
	残効				14日	
	芝安全性	生育期の日本芝・バミューダに薬害有り			影響有り	
流通	ニチノー緑化	エンバイロサイエンス	シンジェンタ特約店	理研グリーン、レインボーユニット	理研グリーン販売店	エムシー緑化、理研グリーン
包装	500ml×4	2kg×6	400g×5	1kg×20、1kg×10	30g×10	1kg×12
A価/kg,L	15,000	4,630	31,000	3,850	120,000	4,850
¥/m ²	1.5~9	9.3~13.9	6.2~12.4	7.7	3.6~7.2	14.6

芝生適用登録農薬(藻類・苔類)

[登録順]

2025.8.6(25-2)
ゴルフ場防除技術研究会

商品名	クロステクト水和剤	モノドクターフロアブル	アルテリア水和剤	シバキープセイバー	ダイセンターフ水和剤
分類	殺菌剤	除草・殺菌剤	殺菌剤	除草剤	殺菌剤
一般名	マンゼブ	ジラム	フマル酸	イマゾスルフロン	マンゼブ
	ミクロブタニル				
有効成分含有量	65% 2%	40%	80%	40%	80%
メーカー	(原体)	コルテバ	大内新興化学工業	住友化学	日産化学
	(登録)	コルテバ	丸和バイオケミカル	レインボー薬品	日産化学
試験名	DAH-502		NR-29	TH-913H4	NC-248水和剤
登録年月日	平成26年9月24日	平成27年10月14日	平成30年6月13日	令和1年7月10日	令和6年2月14日
登録番号	23529	23718	24083	24243	24836
登録上	作物名	日本芝、西洋芝(ベントグラス)	西洋芝(ベントグラス)	西洋芝(ベントグラス)	日本芝、日本芝(コウライ)、西洋芝(ブルー・ベント)
	雑草	藻類	藻類	藻類	日本芝一年生及び多年生広葉雑草・一年生広葉雑草・ヒメクグ・コウライ多年生広葉雑草、西洋芝(ブルー)・一年生広葉雑草・ヒメクグ・西洋芝(ベント)・一年生広葉雑草・ヒメクグ・コケ類
	使用時期	藻類発生初期	藻類発生前～藻類生育期	芝生育期(藻類発生初期)	芝生育期(雑草発生前)(一年生及び多年生広葉)、芝生育期(雑草発生初期)、春夏期芝生育期(コケ類発生初期)
	薬量	3g/m ²	2～4ml/m ²	2～3g/m ²	0.2～0.4ml/m ² 、0.2ml/m ² (西洋芝)
	水量	0.5L/m ²	0.2L/m ²	1L/m ²	0.2～0.3L/m ²
	使用方法	散布	散布	散布	全面土壤処理(雑草発生前)、雑草茎葉散布又は全面処理
急性経口毒性LD50(mg/kg)	普:ラット5,000以上	普:ラット♀300～2,000	普:2,000	普:ラット2,715	普:ラット♀♂>5,000
魚毒性TLm(ppm)	コイ3.67(96h)	コイ1.44(LC50)(96h)	魚42.3	コイ>50	コイ3.5(96h)(LC50)
水溶解度		<0.1ppb(20～25°C)	7g/L	155.6mg/L(20°C)	
半減期				約1日	
スペクトラム	日本芝・カーブラリア、西洋芝・ダラースホット、炭疽病、ビシウム病*、藻類**	炭疽病*、ビシウム病*、赤焼病*、かさ枯病**、葉枯細菌病**、褐条病**、藻類***	かさ枯病、藻類*	広葉雑草全般	ビシウム病、赤焼病、炭疽病、藻類*
樹木等への影響				ドリフト注意	
洋芝への影響				ライグラスに薬害の可能性あり	
作用機作				ALS阻害	多作用点接触活性
効果	発現			1週間程度	
	完成			2週間程度	
	残効			2か月以上	
	芝安全性			安全性大	
流通	丸和バイオケミカル、ニチノー緑化	丸和バイオケミカル	ニッソーグリーン	レインボー薬品	日産化学
包装	1kg×10	2L×6	500g×12	500ml×8	1kg×10
A価/kg.L	3,300	4,475	3,500	14,660	2,000
¥/m ²	9.9	9～17.9	7～10.5	2.9～5.9	4～6